

MODELO DE ROTULAGEM - COSMED

GELOL LINIMENTO

(Bula)

Gelol
salicilato de metila Associado
Linimento

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Linimento. Cartucho contendo frasco com 45 mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO: cada mL do produto contém:

salicilato de metila	75,0 mg
cânfora	57,6 mg
mentol	14,4 mg
terebintina	125,5 mg
veículo* q.sp.	1,00 mL

*essência de mostarda, essência de alfazema, triglicérides de ácidos graxos, álcool etílico.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE: ação esperada do medicamento: o produto é indicado para uso exclusivamente tópico, nos casos de reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas cessará o efeito terapêutico.

Cuidados de armazenamento: o medicamento deve ser mantido em local protegido do calor, da luz e umidade. Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C), com a tampa bem fechada.

Prazo de validade: VIDE CARTUCHO.

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

Atenção: não use medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.

Gravidez e Lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

Cuidados de Administração: siga sempre a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e duração do tratamento.

Interrupção do Tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

REAÇÕES ADVERSAS: INFORME AO SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”
Durante o tratamento, recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

CONTRAINDICAÇÕES: O PRODUTO É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES QUE APRESENTAREM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES: SUSPENDER O USO EM CASO DE HIPERSENSIBILIDADE NA PELE.

“Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.”

“NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS:

salicilato de metila - Revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, invadidas pelo mesmo segmento do Sistema Nervoso Central.

cânfora - Possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda leve anestesia local.

mentol - Aplicado localmente causa sensação de frio por estímulo específico dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.

terebintina - Age como rubefaciente, produzindo dilatação local e aliviando a dor das estruturas profundas.

INDICAÇÕES: reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares.

CONTRAINDICAÇÕES: ANTECEDENTES DE SENSIBILIZAÇÃO AOS COMPONENTES DO PRODUTO.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS: NÃO DEVERÁ SER APLICADO SOBRE FERIDAS ABERTAS. EM CASO DE IRRITAÇÃO, SUSPENDA O USO.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS: AINDA NÃO SÃO CONHECIDAS A INTENSIDADE E FREQUÊNCIA DAS REAÇÕES ADVERSAS.

POSOLOGIA E MODO DE USAR: aplicar uma pequena porção do linimento, na região afetada, massageando-a, uma ou mais vezes ao dia.

SUPERDOSAGEM: na eventual superdosagem acidental, imediatamente suspender a medicação e procurar assistência médica. Recomenda-se tratamento de suporte sintomático.

PACIENTES IDOSOS: não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”

“O PRODUTO É CONTRAINDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS”

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho

Atendimento ao Consumidor: 080077 17017

Reg. MS – 1.7817.0027.004-1

Farm. Resp.: Dr. Carlos Takashi Maki – CRF – SP nº 5606

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S/A.

Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 - Barueri – S.P.

CNPJ nº 61.082.426/0002-07

Indústria Brasileira

Marca Registrada