

MODELO DE ROTULAGEM - COSMED

GELOL POMADA

(Bula)

Gelol Pomada

salicilato de metila 52,50 mg/g + cânfora 44,40 mg/g + mentol 20,00 mg/g + terebintina 191,47 mg/g

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:

Pomada. Cartucho contendo bisnaga com 20 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO: cada grama contém:

salicilato de metila	52,50 mg
cânfora	44,40 mg
mentol	20,00 mg
terebintina	191,47 mg
excipiente* q.s.p.	1,00 g

* essência de mostarda, essência de alecrim, essência de alfazema, butilidroxitolueno, parafina branca, petrolato amarelo e petrolato branco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

Ação esperada do medicamento: o produto é indicado para uso exclusivamente tópico, nos casos de reumatismos, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas.

Cuidados de armazenamento: conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e protegido da luz e umidade.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

Atenção : não use medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.

“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.”

Gravidez e lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração: siga sempre a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem riscos, apenas cessará o efeito terapêutico.

Reações adversas: INFORME AO SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

Contraindicações: O PRODUTO É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES QUE APRESENTAREM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

INFORME AO SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO, OU DURANTE O TRATAMENTO.

Precauções: SUSPENDER O USO EM CASO DE HIPERSENSIBILIDADE NA PELE.

“NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS:

salicilato de metila - Revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, inervadas pelo mesmo segmento do sistema nervoso central.

cânfora - Possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda leve anestesia local.

mentol - Aplicado localmente causa uma sensação de frio por estímulo específico dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.

terebintina - Age como rubefaciente, produzindo dilatação local e aliviando a dor das estruturas profundas.

Indicações: reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares.

Contraindicações: O PRODUTO É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES QUE APRESENTAREM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

Precauções / advertências: NÃO DEVERÁ SER APLICADO SOBRE FERIDAS ABERTAS. EM CASO DE IRRITAÇÃO, SUSPENDA O USO.

Interações medicamentosas: ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

Reações adversas e Efeitos colaterais: AINDA NÃO SÃO CONHECIDAS A INTENSIDADE E A FREQUÊNCIA DAS REAÇÕES ADVERSAS.

Posologia e Modo de usar: friccione a parte dolorida durante alguns minutos, com pequena quantidade do produto, envolvendo-a depois com um pano de flanela ou lã, 2 a 3 vezes ao dia.

Superdosagem: o uso excessivo não dará resultados terapêuticos melhores ou mais rápidos, podendo ocorrer irritação da pele. O produto destina-se exclusivamente a uso tópico, em caso de ingestão acidental, recomenda-se consultar o médico.

Pacientes idosos: não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

“O PRODUTO É CONTRAINDICADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS”

**“ SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”**

Venda sem prescrição médica.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade : vide cartucho/ bisnaga

Atendimento ao Consumidor: 080077 17017

Reg. MS – 1.7817.0027.001-5

Farm. Resp.: Dr. Carlos Takashi Maki – CRF – SP nº 5606

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S/A.

Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 - Barueri – S.P.

CNPJ nº 61.082.426/0002-07

Indústria Brasileira

Marca Registrada